

Preparo de Exames

ANGIOTOMOGRAFIA

Angiotomografia arterial de membro superior (Braço) (Sem Contraste)

1. PREPARO:

Jejum 4 horas.

- Paciente diabético e/ou que faça uso de algum desses medicamentos:

*GLIFAGE

* CLORIDRATO DE METFORMINA

*GLUCOFORMIM

Deverão suspender a medicação 24 horas após a realização do mesmo, com autorização do seu médico assistente que deverá orientá-lo (a) sobre a medicação substituta.

2. CONTRAINDICAÇÃO:

- Gestante;

3. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Trazer o último exame anterior da região que será analisada.

- Chegar 20 minutos antes do horário marcado para triagem.

- Limite de peso para realização é de 150 kg.

- Trazer pedido médico original datado no prazo de 30 (trinta) dias no dia da realização do exame.

Angiotomografia arterial de membro superior (Braço) (Com Contraste)

4. PREPARO:

Jejum 4 horas.

- Paciente diabético e/ou que faça uso de algum desses medicamentos:

*GLIFAGE

* CLORIDRATO DE METFORMINA

*GLUCOFORMIM

Deverão suspender a medicação 24 horas após a realização do mesmo, com autorização do seu médico assistente que deverá orientá-lo (a) sobre a medicação substituta.

5. CONTRAINDICAÇÃO:

- Gestante;

6. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Trazer o último exame anterior da região que será analisada.

- Chegar 20 minutos antes do horário marcado para triagem.

- Limite de peso para realização é de 150 kg.

- Trazer pedido médico original datado no prazo de 30 (trinta) dias no dia da realização do exame.